

| 予防接種                                 | 標準的な接種年齢と接種回数<br>(できるだけこちらの年齢内に受けましょう)                                  |                                                                   |                                                              | 対象年齢                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ロタ<br>ロタリックス                         | 生後2か月に至った時から24週に達するまでの間に2回<br>(初回接種は生後14週6日まで。2回目は1回目の接種から<br>27日以上あける) |                                                                   | 経口接種です。ワクチンにより、接種間隔、<br>回数が異なります。ど<br>ちらか1つを選び、接種<br>してください。 | 生後6週～24週まで<br>(初回接種は生後14週6日に<br>至るまで)    |
| ロタ<br>ロタテック                          | 生後2か月に至った時から32週に達するまでの間に3回<br>(初回接種は生後14週6日まで。それぞれの間は27日以上<br>あける)      |                                                                   |                                                              | 生後6週～32週まで<br>(初回接種は生後14週6日に<br>至るまで)    |
| B型肝炎                                 | 生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの間に3回<br>(27日以上の間隔で2回接種後、1回目の接種から139日以上あける)       |                                                                   |                                                              | 生後1歳に至るまで                                |
| ヒブ                                   | 接種開始年齢                                                                  | 初回                                                                | 追加                                                           | 生後2か月～5歳に至るまで                            |
|                                      | 生後2～7か月未満                                                               | 4～8週の間隔で3回                                                        | 3回目の接種後から7～13か月の間に1回                                         |                                          |
|                                      | 生後7～12か月未満                                                              | 4～8週の間隔で2回                                                        | 2回目の接種後から7～13か月の間に1回                                         |                                          |
|                                      | 1歳～5歳未満                                                                 | 1回                                                                |                                                              |                                          |
| 小児用肺炎球菌                              | 生後2～7か月未満                                                               | 27日以上の間隔で3回                                                       | 1歳を過ぎ3回目の接種から60日以上あけて1回                                      |                                          |
|                                      | 生後7～12か月未満                                                              | 27日以上の間隔で2回                                                       | 1歳を過ぎ2回目の接種から60日以上あけて1回                                      |                                          |
|                                      | 1歳～2歳未満                                                                 | 60日以上の間隔で2回                                                       |                                                              |                                          |
|                                      | 2歳～5歳未満                                                                 | 1回                                                                |                                                              |                                          |
| 五種混合<br>ポリオ・百日咳・<br>ジフテリア・破傷風・ヒ<br>ブ | 1期初回                                                                    | 生後2か月に達した時から7か月に達するまでの間に3回<br>(それぞれの間は20日～56日あける)                 |                                                              | 生後2か月～7歳6か月未満                            |
|                                      | 1期追加                                                                    | 初回3回目を終了後6か月から18か月までの間隔をあけて1回                                     |                                                              | 生後2か月～7歳6か月未満<br>(初回3回終了後6か月以上<br>間隔をおく) |
| BCG                                  | 生後5か月に達した時から生後8か月に達するまでの間に1回                                            |                                                                   |                                                              | 生後1歳に至るまで                                |
| 麻しん<br>風しん<br>混合                     | 1期                                                                      | 1歳から2歳に至るまでの間に1回                                                  |                                                              | 1歳～2歳                                    |
|                                      | 2期                                                                      | 5歳以上7歳未満で、小学校入学前1年間(年長児)に1回<br>(4月1日をもって小学校入学となるため、その前の3月31日まで)   |                                                              | 5歳以上7歳未満で小学校<br>入学前1年間                   |
| 水痘                                   | 1回目                                                                     | 1歳から1歳3か月に至るまでの間に1回                                               |                                                              | 1歳～3歳未満                                  |
|                                      | 2回目                                                                     | 1回目接種終了後6か月から12か月の間隔をあけて1回                                        |                                                              | 1歳～3歳未満(1回目終了後<br>3か月以上間隔をおく)            |
| 日本脳炎                                 | 1期初回                                                                    | 3歳に達した時から4歳に達するまでの間に2回<br>(それぞれの間は6～28日あける)                       |                                                              | 生後6か月～7歳6か月未満                            |
|                                      | 1期追加                                                                    | 4歳に達した時から5歳に達するまでの間に1回<br>(初回2回目から1年おく)                           |                                                              | 生後6か月～7歳6か月未満<br>(初回終了後1年おく)             |
|                                      | 2期                                                                      | 11歳に達した時から10歳に達するまでの間に1回                                          |                                                              | 9～13歳未満                                  |
| 二種混合                                 | 2期                                                                      | 11歳に達した時から12歳に達するまでの間に二種混合(ジフテリア・破<br>傷風)を1回                      |                                                              | 11歳以上13歳未満                               |
| 子宮頸がん                                | 2価                                                                      | 1回目接種から1か月あけて2回目、1回目接種から6か月あけて3回目                                 |                                                              | 小学校6年生～高校1年生<br>相当年齢の女子                  |
|                                      | 4価                                                                      | 1回目接種から2か月あけて2回目、1回目接種から6か月あけて3回目                                 |                                                              |                                          |
|                                      | 9価                                                                      | 1回目接種が15歳未満：1回目接種から6か月あけて2回目<br>(1回目と2回目の接種間隔が5か月未満の場合、3回目の接種が必要) |                                                              |                                          |

|  |   |                                                   |  |
|--|---|---------------------------------------------------|--|
|  | シ | 1回目接種が15歳以上：1回目接種から2か月あけて2回目、<br>1回目接種から6か月あけて3回目 |  |
|--|---|---------------------------------------------------|--|